David Acheson

Das Wunder der GEOMETRIE

ANACONDA

Eine kurze
Geschichte der
Mathematik

DAVID ACHESON

Das Wunder der Geometrie

Eine kurze Geschichte der Mathematik

Aus dem Englischen von Dietlind Falk

Anaconda

Titel der englischen Originalausgabe:

The Wonder Book of Geometry. A Mathematical Story

Oxford: Oxford University Press 2020

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Copyright © David Acheson 2020

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

Lizenzausgabe mit freundlicher Genehmigung

© dieser Ausgabe 2022 by Anaconda Verlag, einem Unternehmen der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Alle Rechte vorbehalten.

Umschlagmotive: Adobe Stock / paw (Zauberer), orbcart (geometrische Formen)

Umschlaggestaltung: Druckfrei. Dagmar Herrmann, Bad Honnef

Satz und Layout: InterMedia – Lemke e. K., Heiligenhaus

ISBN 978-3-641-29016-0

V001

www.anacondaverlag.de

Inhalt

1. Einleitung

2. Erste Schritte

3. Euklids *Elemente*

Euklid, 1732

4. Satz des Thales

Die mathematische Welt des antiken Griechenlands

5. Geometrie in Aktion

6. Der Satz des Pythagoras

7. »Verliebt in die Geometrie«?

371 Beweise für Pythagoras

8. »Stellen Sie sich meine Begeisterung vor, Watson ...«

9. Kongruenz und Ähnlichkeit

Der Goldene Schnitt

10. Im Umkehrschluss ...

11. Kreissätze

12. Tangenten

13. Von Tangenten zum Überschall

Galileo und der Satz des Thales

14. Was genau ist π eigentlich?

15. Die Geschichte der Ellipse

16. Geometrie durch Koordinaten

Inspektor Euklid ermittelt ...

17. Geometrie und Analysis

18. Ein Königsweg zur Geometrie?

19. Unerwartete Aufeinandertreffen

20. Der Satz von Ceva

Noch mehr π

21. Eine Art Symmetrie

22. Plagiat in Woolwich?

23. Fermats Problem

24. Eine saubere Lösung

25. Geometrie im *Ladies' Diary*

Euklid, 1847

26. Euklid

27. Euklids Parallelenaxiom

Beweis durch Bilder?

28. »Eine neue Theorie der Parallele?«

29. Anti-Euklid?

30. Wenn Geometrie schiefgeht

31. Geometrie aus neuen Blickwinkeln

32. Und zu guter Letzt ...

Anmerkungen

Weiterführende Literatur

Danksagung

[Bildnachweis](#)

[Index](#)

Einleitung

Alles begann in der Schule, an einem kalten Wintermorgen des Jahres 1965. Ich war zehn.

Mr. Harding rechnete gerade etwas an der Tafel, von seiner Hand rieselte der Kreidestaub, und plötzlich drehte er sich um und befahl uns, einen Halbkreis mit Durchmesser AB zu zeichnen.

Anschließend sollten wir uns auf dem Halbkreis einen beliebigen Punkt P suchen, ihn mit A und B verbinden und den so entstehenden Winkel P messen ([Abb. 1](#))

Abb. 1 Der Satz des Thales.

Ich tat wie geheißen und nahm an, der Winkel bei P hinge davon ab, wo auf dem Halbkreis sich P befand.

Doch ich lag *falsch*.

Es waren immer 90° .

Zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass die Mathematik voller Überraschungen steckte.

Ich hatte auch noch nie etwas von diesem Mathematiker namens Thales gehört, der im antiken Griechenland gelebt hatte und dem wir einen der ersten bedeutenden Lehrsätze der Geometrie zu verdanken hatten. Laut Thales soll die entscheidende Frage nicht gelautet haben: »Was wissen wir?«, sondern vielmehr: »Wie können wir das wissen?«

Warum also beträgt der Winkel bei P auf dem Halbkreis immer 90° ?

»Sie wollen den Beweis? Da haben Sie ihn!«

Abb. 2 Mathematiker unter sich.

Kurz gesagt lässt es sich eben beweisen, und zwar durch eine simple Abfolge logischer Schritte, die sich aus einigen offensichtlichen Anfangsannahmen ergeben.

Auf den nächsten Seiten möchte ich Sie nicht nur durch den Beweis des Satzes des Thales führen, nein, mein Ziel ist weit ehrgeiziger gesteckt.

Denn in der Geometrie zeigen sich der Geist und die Natur der Mathematik mithin von ihrer schönsten Seite, sie kann uns in jedem Alter begeistern, *und das alles binnen einer halben Stunde.*

Sie glauben mir nicht? Nun ...

Erste Schritte

Die erste wichtige Idee ist die der sogenannten *Parallelen*.

Hierbei handelt es sich um Geraden, die in einer Ebene liegen, einander jedoch nicht schneiden, ganz gleich, wie weit man sie verlängert.

Ich werde über sie zwei Annahmen machen.

Parallelen

Stellen wir uns zwei parallel zueinander liegende Geraden vor, die von einer weiteren Geraden geschnitten werden, sodass die sogenannten Stufenwinkel entstehen ([Abb.3](#)).

Abb. 3 Stufenwinkel.

Beinahe für die gesamte Länge dieses Buches werde ich annehmen, dass

- (1) Stufenwinkel gleich groß sind, wenn die beiden Geraden parallel zueinander verlaufen und
- (2) die zwei Geraden parallel zueinander verlaufen, wenn die Stufenwinkel gleich groß sind.

Diese Annahmen ergeben sich aus der intuitiven Vorstellung, dass zwei Parallelen sozusagen »in dieselbe Richtung verlaufen«, und auch wenn sich leichthin sagen ließe, (1) und (2) lägen doch völlig auf der Hand, so sind es bisher eben nur *Annahmen*.

Und selbst zu diesem frühen Zeitpunkt in unserer Beweisführung sollte man sich klarmachen, dass sie sehr unterschiedliche Funktionen haben.

Durch (1) können wir Parallelen verwenden, während uns (2) dabei hilft, zu zeigen, dass wir überhaupt welche haben.

Winkel

Wir werden Winkel in Grad angeben, dafür steht das Zeichen $^{\circ}$. Die beiden Teile einer Geraden durch den Punkt P bilden einen Winkel von 180° ([Abb. 4](#)).

Abb. 4 Eine Gerade.

Die Hälfte davon ist ein *rechter Winkel*, also ein Winkel mit 90° . Die beiden Geraden, durch die er gebildet wird, sind rechtwinklig oder orthogonal zueinander ([Abb. 5](#)).

Abb. 5 Rechte Winkel.

Gegenwinkel

Schneiden sich zwei Geraden, so sind die sogenannten *Gegenwinkel* gleich groß ([Abb. 6](#)).

Abb. 6 Gegenwinkel.

Wechselwinkel

Werden zwei Parallelen von einer dritten Geraden geschnitten, dann sind die sogenannten *Wechselwinkel* gleich groß ([Abb. 7](#)).

Abb. 7 Wechselwinkel.

Abb. 8 Beweis dafür, dass Wechselwinkel gleich groß sind.

Wie [Abb. 8](#) zeigt, liegt dies daran, dass $a = b$ (Stufenwinkel) und $b = c$ (Gegenwinkel). Daraus ergibt sich, dass $a = c$.

Auch der Umkehrschluss ist zulässig: Sind die Wechselwinkel gleich groß, so muss es sich bei den Geraden um Parallelen handeln.

Das ist alles, was man wissen muss, um unseren ersten Lehrsatz zu beweisen – Wer hätte das gedacht!

Die Summe der Winkel in einem Dreieck

Die Winkel innerhalb eines Dreiecks ergeben in der Summe immer 180° ([Abb. 9](#)).

Abb. 9 Winkelsumme in einem Dreieck.

Um dies zu beweisen, ziehen wir gegenüber einer der Seiten eine Parallele durch einen Eckpunkt des Dreiecks ([Abb. 10](#)).

Abb. 10 Beweis für die Winkelsumme eines Dreiecks.

Die Winkel a sind gleich groß (Wechselwinkel).

Aus demselben Grund sind die Winkel b gleich groß.

Und da es sich bei der neuen Linie um eine Parallele handelt, ergeben $a + b + c = 180^\circ$, was zu beweisen war.

Euklids Elemente

Das berühmteste Beispiel für diese präzise, deduktive und umsichtig strukturierte Art, die Geometrie zu behandeln, sind die *Elemente*, die Euklid von Alexandria ([Abb. 11](#)) etwa 300 v. Chr. verfasste.

Abb. 11 Euklid.

Ich möchte gleich zu Beginn vorwegnehmen, dass Euklid in den *Elementen* ([Abb. 12](#)) für seine exakten Lehrsätze und Beweise im Grunde imaginäre Objekte heranzieht.

Abb. 12 Die älteste Ausgabe von Euklids *Elementen*, MS. D'Orville 301, sie wurde 888 in Konstantinopel von Stephen the Clerk für Arethas von Patras angefertigt.

Eine Euklidische Gerade ist beispielsweise nicht nur »absolut« gerade – sie hat auch eine *Breite von null*. Selbst wenn es mir also gelänge, sie perfekt zu ziehen, könnte man sie nicht sehen.

Auch ein Punkt ist nicht etwa ein winziges rundes Etwas – auch er besitzt keine Dimension. In Euklids Worten:

Ein Punkt ist das, was ohne Teil ist.

Man sollte erwähnen, dass Euklid sich keiner »Längenmaße« bedient, wie wir sie heute kennen, und seine Winkel misst er nicht in Grad. Das einzige, was er an Winkelgröße verwendet, ist das Konzept des *rechten Winkels*, von dem macht er ausgiebig Gebrauch ([Abb. 13](#)).

Abb. 13 Der Beweis dafür, dass Gegenwinkel gleich groß sind, aus einer Ausgabe der Euklidischen Elemente von 1732.

Trotz dieser Tatsachen und dem gelinde gesagt nüchternen Stil haben die *Elemente* des Euklid in der Geschichte der Menschheit wohl größeren Einfluss gehabt als jedes andere Buch – und mehr Neuauflagen.

Am Ende führt nicht nur ein *einzig*er Weg in die Geometrie, wir alle müssen für uns selbst herausfinden, wie wir uns diesem mathematischen Gebiet nähern.

Sollte ich in diesem Buch dank meiner etwas aktualisierten Grundannahmen schneller voranpreschen als Euklid, dann nur, um meine Leserschaft schneller zu interessanten und überraschenden Ergebnissen zu führen ...

Euklid, 1732

C. Aught

EUCLIDE'S ELEMENTS;

The whole FIFTEEN BOOKS
compendiouſly Demonſtrated:

WITH

ARCHIMEDES'S Theorems of
the Sphere and Cylinder Inveſtigated
by the *Method of Indivifibles*.

By ISAAC BARROW, D.D. *late Maſter
of Trinity College in Cambridge.*

To which is Annex'd,

EUCLIDE'S *Data*, and a brief
Treatiſe of Regular Solids.

The Whole revis'd with great Care,
and ſome Hundreds of Errors of the
former Impreſſion corrected.

By THOMAS HASELDEN, *Teacher
of the Mathematicks.*

Καθαροὶ ψυχῆς λογικῆς εἰσιν αἱ μαθηματικαὶ ἐπισημοί.

LONDON: Printed for Daniel Midwinter and Aaron
Ward in Little-Britain; Arthur Bettesworth and Charles
Hitch in Pater-noster-row: and Thomas Page and William

Mount on Towser-Hill, 1732.

Der Satz des Thales

Der Satz des Thales besagt, dass der Winkel eines beliebigen Punktes auf einem Halbkreis immer 90° beträgt. Um dies zu beweisen, benötigen wir nur ein bis zwei weitere Schlüsselgedanken.

Kongruente Dreiecke

Als kongruente Dreiecke bezeichnet man Dreiecke, die *in Form und Flächeninhalt exakt übereinstimmen*.

Um zwei Dreiecke auf Kongruenz zu prüfen, ist es natürlich am einfachsten, die Länge von zwei Seiten zu messen und den Winkel zu bestimmen, den sie bilden.

Dieser sehr simple Kongruenz-Test nennt sich auch SWS (Seite-Winkel-Seite).

Abb. 14 Kongruenz durch SWS.

Gleichschenklige Dreiecke

Bei einem gleichschenkligen Dreieck sind zwei Seiten gleich.

Dreiecke dieser Art spielen in der Geometrie eine wichtige Rolle, da die sogenannten *Basiswinkel eines gleichschenkligen Dreiecks gleich groß sind* ([Abb. 15](#)).

Abb. 15 Ein gleichschenkliges Dreieck.

Für viele liegt diese Erkenntnis sicherlich auf der Hand, schließlich sieht ein gleichschenkliges Dreieck von vorne und von hinten genau gleich aus.

Etwas formaler lässt sich dies beweisen, wenn wir eine Strecke CD ziehen, die den Winkel bei C halbiert ([Abb. 16](#)).

Abb. 16 Der Beweis, dass die Basiswinkel eines gleichschenkligen Dreiecks gleich groß sind.

Die Dreiecke ACD und BCD sind durch SWS kongruent zueinander, wobei das eine Spiegelbild oder eine seitenverkehrte Version des anderen ist. Die Winkel von A und B müssen also gleich groß sein.

(Sind *alle drei* Seiten eines Dreiecks gleich groß, so nennt man es *gleichseitig*. Das Dreieck ist also an drei Stellen gleichschenklilig, was bedeutet, dass darin alle drei Winkel gleich sein müssen.)

Kreise

Ein Kreis zeichnet sich dadurch aus, dass all seine Punkte gleichweit von einem *Mittelpunkt* entfernt sind, den wir M nennen.

[Abb. 17](#) verdeutlicht einige Grundbegriffe rund um den Kreis.

Abb. 17 Der Kreis.

Mehr Vorwissen braucht es nicht, um den Satz des Thales zu beweisen.

Der Satz des Thales

Wir möchten beweisen, dass, wenn P auf dem Halbkreis liegt wie in [Abb. 18](#), der $\angle APB = 90^\circ$, wobei $\angle APB$ den Winkel zwischen AP und PB bezeichnet.

Am einfachsten bedient man sich der Tatsache, dass P auf dem Halbkreis liegt, indem man die Strecke MP zieht und feststellt, dass $MP = MA = MB$, da alle Punkte auf dem Kreis denselben Abstand vom Mittelpunkt haben.

Abb. 18 Beweis für den Satz des Thales.

Plötzlich ergeben sich zwei *gleichschenklige Dreiecke*, AMP und BMP.

Die beiden Basiswinkel a müssen daher gleich groß sein, ebenso wie die beiden Basiswinkel b .

Die drei Winkel innerhalb des großen Dreiecks AMB müssen 180° ergeben, also

$$a + (a + b) + b = 180^\circ$$

sodass $a + b = 90^\circ$. Daraus folgt, dass $\angle AMB = 90^\circ$ betragen muss: Der Satz ist bewiesen.

In all den Jahren, seit mir dieser Beweis an einem kalten Wintermorgen des Jahres 1956 zum ersten Mal vorgeführt wurde, habe ich ihn nicht vergessen.

Auf den ersten Blick würde man vielleicht ein anderes Ergebnis erwarten, doch binnen weniger Minuten wird einem vermutlich ein Licht aufgehen und man wird sagen: »Ach so, ist ja logisch – *wenn man es auf diese Art betrachtet*.

Meiner Erfahrung nach zeichnen sich die Sternstunden der Mathematik häufig durch genau diese Erkenntnis aus.

Die mathematische Welt des antiken Griechenlands

Thales lebte in Miletus.

Pythagoras stammte von der Insel Samos, zog jedoch später nach Crotona.

Über dem Eingang der **Platonischen Akademie** in Athen fand sich diese berühmte Inschrift:

ΑΓΕΩΜΕΤΡΗΤΟΣ
ΜΗΔΕΙΣ ΕΙΣΙΤΩ

»Ohne Kenntnis der Geometrie soll keiner eintreten«

Der Leuchtturm von Pharos, Alexandria

Euklid schrieb *Die Elemente* in Alexandria.

Archimedes lebte und arbeitete in Syrakus.

Geometrie in Aktion

Im Laufe der Geschichte hat die Geometrie in der Praxis vielerlei Verwendung gefunden. Eines der ersten Beispiele dafür war Thales' Versuch, die Höhe der ägyptischen Cheops-Pyramide zu berechnen.

Thales und ähnliche Dreiecke

Thales maß die Länge des Schattens, den die Pyramide durch den Einfall der Sonne warf, und bestimmte L , indem er die Hälfte der Gesamtbreite der Pyramide hinzuaddierte wie in [Abb. 19](#).

Abb. 19 Ähnliche Dreiecke.

Dann maß er den Schatten l einer vertikalen Stange der Höhe h .

Thales ging von der Annahme aus, die Strahlen der Sonne verliefen parallel, und schlussfolgerte, die beiden Dreiecke aus [Abb. 19](#) seien dadurch zwar von sehr unterschiedlicher Größe, ihre *Form* wäre jedoch exakt dieselbe, sodass die jeweiligen Seiten dieselben Verhältnisse zueinander hätten.

Insbesondere schlussfolgerte er, dass

$$\frac{h}{H} = \frac{\ell}{L},$$

und da er die anderen drei Längen kannte, konnte er somit die Höhe der Pyramide H errechnen.

Abb. 20 Thales auf einer griechischen Briefmarke von 1994.

Heute bezeichnen wir Dreiecke derselben Form als ähnliche Dreiecke. Später wird sich zeigen, dass sie in einigen der faszinierendsten Lehrsätze der Geometrie eine tragende Rolle spielen.